

# 林翠蓮議員服務處通告

## 注意個人衛生 預防「猩紅熱」

- 病原體** 猩紅熱是由甲類鏈球菌所引致的感染。
- 病徵** 猩紅熱患者通常為 2 至 8 歲的兒童。  
猩紅熱的症狀為發燒、咽喉痛及出疹。  
皮疹會在發病首天或翌日在軀幹或頸部出現，接着蔓延至四肢，特別是腋窩、肘部及腹股溝。  
典型的猩紅熱疹並不包括面部。該種皮疹的特點是患處皮膚粗糙。皮疹會在 1 星期後消退，手掌和腳底繼而會脫皮。  
隨猩紅熱併發的病症，有時還包括中耳感染和腎病。
- 傳播途徑** 鏈球菌可透過呼吸 或 直接與受感染的呼吸系統分泌物接觸而傳播。
- 潛伏期** 猩紅熱的潛伏期為 1 至 3 日。
- 治理方法**
- 任何人如懷疑患上猩紅熱，應向醫生求診。
  - 經證實患上猩紅熱的病人，應接受完整的抗生素療程。
  - 患上猩紅熱的病人，不應上學或返回幼兒中心，直至完全康復為止。
- 預防方法**
1. 維持良好的個人及環境衛生。
  2. 保持雙手清潔，並用正確方法洗手。
  3. 雙手被呼吸系統分泌物弄污後(如打噴嚏後)應立即洗手。
  4. 打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物。
  5. 保持空氣流通。



文字資料來源: 衛生署衛生防護中心

林翠蓮區議員服務處

電話: 2975 0226

開放時間: 星期一、三、五 朝九晚五  
星期二、四 朝十晚九

地址: 小西灣邨 瑞強樓 地下 1 室  
(小西灣邨廣場四樓 直行通過公園後, 再直行籃球場右邊)

網址: [www.cllam.com](http://www.cllam.com) 電郵: [alice@cllam.com](mailto:alice@cllam.com)